

FICHA TÉCNICA

FEROMONAS

Feromonas para trampas adhesivas

DESCRIPCIÓN

Las feromonas son sustancias químicas volátiles emitidas por los organismos vivos para inducir una reacción en organismos de la misma especie, generalmente son mensajes de llamada sexual o agregación. La aplicación de feromonas dentro de las trampas adecuadas, permite verificar la presencia de determinadas infestaciones.

OBJETIVOS

- *Ephestia spp* y *Plodia interpunctella*
- *Tineola bisselliella*
- *Stegobium paniceum* e *Lasioderma serricorne*
- *Tribolium spp*

TIPO DE FEROMONA



- **Altura:** 18 mm
- **Diámetro interior máximo:** 7 mm
- **Diámetro exterior máximo:** 10 mm
- **Peso medio:** 0,73 g

Colocar la feromona en el interior de la trampa **Check Trap** (para el monitoreo de *Ephestia spp* y *Plodia interpunctella*).

Residualidad de la feromona: 2 meses después de la abertura del blíster

Presentación: caja de 15 unidades



- **Altura:** 18 mm
- **Diámetro interior máximo:** 7 mm
- **Diámetro exterior máximo:** 10 mm
- **Peso medio:** 0,73 g

- Colocar la feromona en el interior de la trampa **3 Way Trap** (para el monitoreo de *Tribolium spp*).

Residualidad de la feromona: 2 meses después de la abertura del blíster

Presentación: caja de 15 unidades

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)

Tel. 918 046 164

www.pestnet-europe.es



- **Altura:** 44 mm
- **Diámetro interior máximo:** 4 mm
- **Diámetro exterior máximo:** 6 mm
- **Volumen interior máximo:** 0,5 ml

Colocar la feromona en el interior de la trampa **Check Trap o Monitor Trapa** (para el monitoreo de *Tineola bisselliella*) o **Monitor Trap** (para el monitoreo de *Stegobium paniceum* e *Lasioderma serricorne*).

Residualidad de la feromona: 2 meses después de la abertura del blíster

Presentación: caja de 15 unidades

MODO DE EMPLEO

Abrir la trampa y colocar la feromona en el centro de la superficie adhesiva. Colgar la trampa a una altura no superior a los dos metros. Almacenar en lugar fresco y seco. Cambiar la trampa después de 60 días de uso. Esta trampa puede utilizarse en los planes de control de plagas más comunes y en cualquier entorno en el que se manipulen o almacenen productos agroalimentarios y ganaderos.

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)

Tel. 918 046 164

www.pestnet-europe.es